

# Veille COVID-19 et foie

30 avril 2020

PE Rautou - D Valla


# Covid-19 après transplantation hépatique

Même diversité de présentation/sévérité avec ou sans transplantation  
Lopinavir/ritonavir peu séduisant


- 34 cas rapportés - Lombardie 16, Madrid 6, New York 13, Washington 1
- Incidence inconnue - Absence de dépistage systématique (cas sélectionnés)
- Diversité de présentation - De asymptomatique à état de choc
  - Avec ou sans signe respiratoire, fièvre, ou diarrhée
- Diversité de sévérité - 6/22 décès, 9/35 ventilation invasive
- Risque de sévérité - Homme, plus de 60 ans, hypertension artérielle
- Thrombose - Non rapportée
- Rejet - En cas d'immunosuppression insuffisante
- Interaction pharmacol. - Marquée et de conséquence pour lopinavir/ritonavir

# Covid-19 au cours d'une maladie chronique du foie

Données très limitées. Apparemment peu d'influence sur Covid-19



Montovani, Liver Int 2020



Wang, Aging 2020

# Atteinte aiguë sévère du foie sans cause évidente contemporaine d'une Covid-19

- Homme de 65 ans admis pour pneumonie
- SARS-CoV-2 (écouvillonnage nasal)
- Ventilation mécanique à J2
- Vasopresseurs (autour de J13)
- Toujours en USI à J20
- Causes habituelles d'hépatite aiguë exclues

- Atteinte directe du SARS ?
- Rôle des défaillances d'organe ?

